

Bulletin pousse de l'herbe régional N°8. Rédigé le 28/04/15

Un rythme de croissance soutenu qui se maintient.

83 kg MS/ha/jour, c'est la croissance moyenne de l'herbe sur les fermes du réseau. Les 10 jours d'avance au pâturage sont assurés dans la plupart des fermes du réseau. Les écarts de dynamique de pousse sont de plus en plus marqués. Encore une fois, la pluie du week-end dernier est très disparate selon les secteurs (de 2 à plus de 15 mm).

Ajuster le circuit de pâturage en fonction de la hauteur d'herbe.

Bien refaire le point sur les hauteurs d'herbe dans tous les paddocks. Avec ce niveau de pousse, les hauteurs évoluent rapidement, au-delà de 12 cm, il faut se poser la question de débrayer la parcelle, une fauche précoce permettra de la réintroduire rapidement en pâturage. Les conditions ont permis jusqu'à présent de maîtriser les hauteurs sorties, il faut continuer dans ce sens. Le circuit de pâturage doit être ajusté en fonction aussi de la flore présente dans les parcelles (attention à la croissance rapide du dactyle et la féтуque en ce moment). Plus encore que du ray-grass, pâturé trop haut, la qualité de repousse de ces espèces sera d'autant plus pénalisée par la suite.

Les légumineuses sont bien présentes. C'est de bon augure pour la suite !

A la faveur d'un début de printemps très ensoleillé et de bonnes conditions d'exploitation de l'herbe, bon nombre de retours de terrain font état d'une (très) bonne proportion de trèfles dans les parcelles pour la saison. C'est de bon augure pour la suite... quand la graminée aura encore besoin d'eau... et d'azote pour pousser. Aussi, les apports d'azote au 2^{ème} cycle (30 à 40 unités) doivent se limiter aux parcelles en déficit de légumineuses ; celles-ci marquent les bousats 8 à 10 jours après la sortie des animaux.



○ Vaches laitières
 ☆ Vaches laitières BIO
 ● Vaches allaitantes
 ★ Vaches allaitantes BIO
 Les mesures sont exprimées en kg MS/ha/jour
 NR : non renseigné

Action partenariale : Chambres d'agricultures Pays de la Loire, ECLA, ACE, CLASEL, BCSVC

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 21 au 27 avril 2015	Hauteur moyenne (cm)	Jours d'avance au pâturage (hauteur de pâturage 5 cm)					
			20 ares/VL	30 ares/VL	40 ares/VL	50 ares/VL	40 ares/VA+v	50 ares/VA+v
Zone Nord	78	10,8	14	22	29	36	26	33
Zone Intermédiaire	97	11,1	15	23	30	38	28	35
Zone Sud - Nord Loire	77	10,5	14	21	27	34	25	31
Zone Sud - Sud Loire			-12	-19	-25	-31	-23	-28