

Bulletin pousse de l'herbe régional N°14 - Rédigé le 07/06/2017

Sur la semaine passée, la croissance moyenne à l'échelle de la région se situe à 40 kg MS/ha/jour, en-dessous des valeurs moyennes de fin de printemps habituellement proches de 50 à 60 kg MS/ha/j.

Une situation toujours très contrastée

Sur la semaine passée, la croissance reste relativement stable sur la zone Sud. Par contre, elle baisse de manière significative sur la zone intermédiaire en lien avec une diminution des hauteurs d'herbe (les parcelles les plus hautes ou épiées sont sorties des mesures). La zone Nord connaît actuellement sa pleine période de pousse.

A cette période, les repères de croissance sont parfois faussés par des hauteurs assez élevées sur certaines parcelles et un nombre de parcelles mesurées plus réduit. C'est le cas, par exemple, à la Roche sur Yon où il y a peu de parcelles mesurées avec des hauteurs élevées (hauteur moyenne 12,7 cm).

Même si les précipitations de mai et début juin font du bien, elles sont hétérogènes et n'ont pas permis de corriger le déficit des mois de mars et avril. La réserve hydrique est quasiment à 0 jusque dans les sols moyennement profonds. La fréquence des précipitations va être la clé de la suite de la fin de la saison d'herbe du printemps.

Faucher dès que possible

Il ne faut maintenant plus attendre pour faucher les dernières parcelles de foin. Seules quelques averses sont annoncées en fin de semaine, ensuite la tendance est plutôt à un temps estival. Avec une fauche sur la 1^{ère} quinzaine de juin, une repousse encore relativement rapide des parcelles est encore possible si les températures n'augmentent pas trop sur les sols plus profonds, ces parcelles pourront être pâturées vers la mi-juillet.

En zone Nord, la pousse est actuellement élevée, on est en pleine période de pousse. Faites le tour de vos parcelles pour évaluer les jours d'avance et organiser l'ordre de pâturage. Au-delà de 15 jours d'avance, l'excédent doit être fauché. Privilégier les parcelles dont la hauteur d'herbe est la plus élevée et/ou les parcelles où la maîtrise des épis a été plus délicate.

Pâturer des parcelles avancées

Dans les situations tendues sur les fourrages, il ne faut pas hésiter à faire pâturer des parcelles initialement prévues pour la fauche, notamment pour des animaux à besoins modérés. Le fil avant permettra de réduire le gaspillage.



- Vaches allaitantes
- ★ Vaches allaitantes BIO
- Vaches laitières
- ☆ Vaches laitières BIO

Les mesures sont exprimées en kg MS/ha/jour

NS : non significatif

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 29 mai au 5 juin 2017	Hauteur moyenne (cm)	Jours d'avance au pâturage (hauteur de pâturage 5 cm)					
			20 ares/VL	30 ares/VL	40 ares/VL	50 ares/VL	40 ares/VA+v	50 ares/VA+v
Zone Nord	85	10,8	14	21	28	35	26	32
Zone Intermédiaire	36	8,8	9	14	18	23	17	21
Zone Sud - Nord Loire	32	9,1	10	15	20	25	18	23
Zone Sud - Sud Loire	45	10,5	13	20	27	33	25	31

Croissance (kgMS/ha/j)	ares disponibles/UGB							
	15	20	25	30	35	40	50	60
20	3	4	5	6	7	8	10	12
30	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18
40	6	8	10	12	14	16	20	24
50	8	10	13	15	18	20	25	30
60	9	12	15	18	21	24	30	36
80	12	16	20	24	28	32	40	48

Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j